

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES

N° 4 - 24 juin 1987

LUZERNE A GRAINES


(en collaboration avec la FNAMS et les
SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

TYCHIUS : QUELQUES PARCELLES ATTEIGNENT LE SEUIL DE TRAITEMENT
TORDEUSES : DÉBUT DU VOL - ATTENDRE -

Le SEUIL DE NUISIBILITE DE 25 captures - en 5 x 5 coups de filet fauchoir - est quelque-fois largement atteint en zone précoces cotières (Sud-Gard, Est-Hérault, Est-Audois) où le STADE SENSIBLE GOUSSES VERTES est prédominant.

En zones plus tardives ouest-audoise et nord-gardoise, et, sur parcelles précoupées tardivement, protégez la floraison (voir bulletin n° 3 du 4 juin 87).

T R A I T E Z à l'aide d'une spécialité
(Azophène, Zolone) contenant de la phosalone
à raison de 1000 g ma/ha de préférence en
soirée en l'absence de pollinisateur.



Adulte de tychius
(largeur 2,5 mm)
couleur verdâtre

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92 41 40



MAIS

(en collaboration avec les SUAD
de l'Hérault et du Gard)

PYRALE : - INTENSIFICATION DU VOL

- PREMIÈRES PONTES FRAÎCHES OBSERVÉES DANS LA NATURE

AUTRES RAVAGEURS : PEU PRÉSENTS, MAIS ATTENTION AUX NOCTUELLES TERRICOLES

* Suite à la pluie du 13 juin, le vol (en cage d'élevage à Montpellier) s'est considérablement intensifié. Son maximum risque de s'établir dans la période du 15 au 25 juin.

* Les premières pontes fraîches ont été observées du 16 au 18 juin à l'Est de Montpellier.

* La période optimale de traitement - pour les parcelles qui l'imposent :

risque moyen pour 0,5 à 0,8 chenille par canne) à l'automne

risque fort pour plus de 0,8 chenille par canne) 86

- devrait se situer dans la première décade de juillet.

* Le prochain bulletin fera plus précisément le point de la situation.

